



ZDROJOWA
clinic

Zielona Góra, ul. Zdrojowa 2
68-320-37-55
607-201-202

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO KOLONOSKOPII preparatem EZICLEN

Przygotowanie do badania ma na celu całkowite usunięcie z jelita grubego mas kałowych, które przesłaniają błonę śluzową jelita.

NA 4 DNI PRZED BADANIEM:

- należy zastosować dietę lekkostrawną, bez owoców pestkowych (np. kiwi, truskawki), pomidorów, maku, ziaren zbóż oraz surowych owoców i warzyw
- można spożywać buliony, przecedzone zupy i soki, kisiel, budyń, galaretki owocowe, jasne pieczywo, gotowane warzywa, gotowane chude mięso oraz napoje niegazowane

W PRZEDDZIEŃ BADANIA:

- można zjeść posiłek do 12:00 (bez produktów mlecznych, surowych owoców i warzyw, pestek, potraw ciężkostrawnych, napojów gazowanych)
- od tego momentu nie można spożywać pokarmów
- w przypadku uporczywych zaparć można wykonać jednorazową lewatywę
- przez cały dzień należy pić wodę niegazowaną lub herbatę

W DNIU BADANIA:

- można pić wodę niegazowaną do 4 godzin przed badaniem

DAWKOWANIE PREPARATU:

Należy wlać do załączonego kubka zawartość jednej butelki preparatu i uzupełnić wodą niegazowaną do poziomu kreski znajdującej się na kubku (jedna dawka preparatu).

I dawka preparatu	II dawka preparatu
12 godzin przed badaniem (wypić w ciągu 0,5-1 godziny)	6 godzin przed badaniem (wypić w ciągu 0,5-1 godziny)
następnie należy wypić minimum 1 litr wody niegazowanej w ciągu godziny	następnie należy wypić minimum 1 litr wody niegazowanej w ciągu godziny

UWAGA!

- Na badanie należy wziąć całą dokumentację medyczną oraz spis zażywanych leków.
- Osoby przyjmujące przewlekle stosowane leki powinny przyjąć je co najmniej 2 godziny przed lub po spożyciu środka przeczyszczającego.
- Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania.
- Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenocumarol, acard, aspiryna) powinny zaprzestać przyjmowania leków na 7 dni przed badaniem lub zmodyfikować ich dawkowanie **po konsultacji z lekarzem zlecającym te leki**.
- Na 7 dni przed badaniem należy odstawić preparaty żelaza.
- Fakt nosicielstwa chorób wirusowych (np. WZW C, HIV) należy zgłosić podczas rejestracji na badanie.
- Po badaniu pacjent przebywa w sali obserwacyjnej – czas obserwacji zależy od rodzaju zabiegu i stanu pacjenta i może wynosić od 30 minut do 3 godzin.
- Po badaniu obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów przez minimum 10 godzin.